

Voyage de M. Ch. Delagrange dans la Haute-Syrie.

LISTE DES ANTHICIDES ET SUPPLÉMENT
AUX LONGICORNES

PAR MAURICE PIC.

Ce mémoire comprend : 1° l'énumération de tous les Anthicides dont j'ai pu vérifier la détermination; 2° un supplément à la liste des Longicornes que j'ai publiée antérieurement (*Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1892, LXI, p. 413-422).

Je rappelle que les Coléoptères dont il s'agit ici proviennent presque tous des environs d'Akbès.

I. Anthicides.

Formicomus ionicus Laf. — *F. nobilis* Fald.

Anthicus floralis L. — *A. quisquilius* Thom. — *A. phoenicius* Truq. — *A. morio* Laf. et var. — *A. libanicus* Desbr. — *A. tristis* Sch. et var. *tristiculus* Reitt. — *A. Truquii* Desbr. — *A. hispinus* Rossi. — *A. aralensis* Reitt. var. — *A. gracilis* Sch. var. — *A. antherinus* L. var. *Syriae* Pic. — *A. transversalis* Vill. (*tenellus* Laf.).

A. truncatus Pic 1894. — *Omnino testaceus, hirsuto-pilosus; prothorace sinuato, elytris truncatis, fortiter sparsimque punctatis. Species A. capilligero* Mars. vicina. — Long. 3 mill.

Entièrement d'un testacé brillant, revêtu de poils dressés grisâtres, assez longs, épars. Tête arrondie en arc en arrière, à ponctuation écartée, bien marquée. Antennes dépassant la base du prothorax, à derniers articles peu épaissis, le dernier plus long, terminé en pointe émoussée. Prothorax nettement sinué, dilaté arrondi en avant, un peu élargi sur la base qui est rebordée, à ponctuation forte, écartée. Élytres subovales, assez diminués en avant, à épaules presque effacées, un peu diminués, nettement et largement tronqués à l'extrémité, à ponctuation forte, grosse, écartée. Pygidium saillant. Pattes minces, modérément longues.

Akbès (coll. Pic).

Espèce du groupe des *Stricticomus* (*Stricticolles*) mais remarquable par sa coloration uniforme; bien caractérisée par ses élytres tronqués,

les poils dressés et la ponctuation forte et écartée sur le prothorax et surtout sur les élytres.

Anthicus Delagrangi Pic. — *A. akbesianus* Pic. — *A. latipennis* Pic. — *A. sidonius* Truq. — *A. coarcticollis* Baudi.

Ochthenomus tenuicollis Ross. var.

II. Longicornes.

Prionus besicanus Fairm. — *P. coriarius* L. var.

Ergates (Rhesus) Gaillardoti Chevr.? — ♀ Entièrement brun foncé avec les élytres de teinte plus claire. Antennes minces, dépassant à peine le milieu du corps. Tête impressionnée, avec une ligne médiane brillante. Prothorax très granuleux, bien moins large que les élytres, armé de chaque côté de six épines plus ou moins longues, l'antérieure et surtout la postérieure plus fortes. Écusson large, arrondi au sommet. Élytres atténués en arrière avec une épine suturale et un rebord bien net; épaules saillantes. Dessous du corps noir brillant. — Long. 60 mill.

Le seul exemplaire ♀ que j'ai vu de cette superbe espèce avait été acquis par M. J. Magnin qui s'en est généreusement dessaisi en ma faveur.

Rhamnusium praeustum Reitt. (? var. de *graecum* Schauf.).

Toxotus auricomus Reitt.

Anisorus heterocerus Ganglb. var. *nigripennis* Pic.

Cortodera rubripennis Pic et var. *obscura* Pic.

Leptura (Strangalia) quadrifasciata L. — *L. (Strangalia) bifasciata* var. *nigrosuturalis* Reitt.

Grammoptera ustulata Sch. (*praeusta* F.).

Liagrica (Exilia) timida Mén.

Axinopalpus gracilis (?) var. *latior* Pic (*Miscell. Ent.*, 1896, n° 3).

Callimus egregius Muls.

Delagrangius angustissimus Pic.

Cerambyx velutinus Brullé.

Crioccephalus syriacus Reitt.

Hesperophanes sericeus Fabr.

H. Preissi Heyd. (*Deut. Ent. Zeitsch.*, 1894, p. 85). — Cette espèce

est remarquable par sa coloration d'un fauve obscur et la présence de longs poils dressés sur tout le corps, même sur les membres. — M. Delagrangé n'en a pris qu'un exemplaire, actuellement dans la collection Nadar.

H. griseus Fabr. et var. *elongatulus* Pic (*Miscell. Ent.*, 1896, n° 3).

Cyamophthalmus moesiacus Friv. (*fulvus* Muls.) var.

Calchaenesthes oblongomaculatus Guér.

Plagionotus Bobelayei Brullé. — *P. floralis* Pall. var.

Clytus ciliciensis Chevr.

Dorcadion Destinói Fairm. — *D. Delagrangei* Pic (*L'Échange*, 1894, p. 110) (1). — *D. cinctellum* Fairm.

Provient peut-être d'Aïn-Tab. ?

D. fenestratum Pic, 1894. — *Elytris velutino tomentosus vittisque duabus (dorsali humeralique antice posticeque conjunctis) albidoflavis, pedibus rufis; ♀ obscurius, lateribus haud ampliatis. D. accolae* Heyd. *vicinum*. — Long. 12-14 mill.

Noir, revêtu d'un duvet velouté noir ♂, un peu fauve ♀, avec des bandes d'un blanc un peu jaunâtre; dessous du corps, pattes et antennes rougeâtres, ces dernières assez obscurcies. Tête avec deux taches occipitales presque triangulaires de duvet noir velouté, sillonnée sur son milieu. Prothorax modérément court, épineux sur le milieu de ses côtés, orné de deux bandes dorsales de duvet noir velouté; une étroite ligne médiane et les côtés, en-dessous, largement revêtus de duvet blanc jaunâtre. Écusson blanc. Élytres peu diminués et un peu anguleux aux épaules, tronqués arrondis à l'extrémité, ornés chacun d'une large bordure externe, d'une étroite ligne suturale et de deux bandes (l'interne réunie vers les épaules et près de l'extrémité à l'externe qui se prolonge jusqu'à l'extrémité), formées de duvet d'un blanc légèrement jaunâtre. La ♀ présente les mêmes dessins de bandes que le ♂, mais sa couleur foncière est un peu brunâtre; elle présente aussi, comme beaucoup d'espèces de ce genre, des macules plus foncées mais variables près de la suture; ses élytres sont régulièrement ovalaires sur les côtés, à peu près comme chez le ♂, au lieu d'être sensiblement élargis vers leur milieu puis très diminués vers l'extrémité comme chez la ♀ de *D. accola* Heyd.

Environs d'Aïn-Tab (coll. Delagrangé et Pic).

(1) C'est le *Dorcadion* cité sous le nom de *D. Eugeniae* dans mon 1^{er} Mémoire (cf. p. 418).

Cette espèce, voisine par son dessin des *D. Delagrangei* Pic, *D. alepense* Kr., *D. accola* Heyd., rappelle plutôt ce dernier, mais la bande prothoracique médiane est plus étroite, non dénudée dans son milieu, la forme ♀ est différente, etc.

Acanthoderes clavipes var. **grisescens** var. nov. — Large et un peu déprimé en dessus. Cette variété est caractérisée par sa pubescence à fond grisâtre, parsemée de quelques petites taches brunâtres assez régulièrement disposées, seulement avec une sorte de fascie sinueuse, foncée, courte, parfois interrompue, sur chaque élytre après le milieu.

Liopus femoratus Fairm. var.

Agapanthia cynarae Germ.

Saperda (Compsidea) ocellata Ab. (1).

Coptosia sancta Reiche.

(1) Cette espèce est celle que j'ai citée sous le nom de *quercus*, p. 418 de mon 1^{er} Mémoire.

